

**AVERTISSEMENTS AGRICOLES****BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES**

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

**ARBO. VITI. RHONE-ALPES****ABONNEMENT ANNUEL: 90f**

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A

**Circonscription RHONE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3**

20 Mars 1984

N° de série continue 273

Bulletin n° 5

**ARBRES FRUITIERS**CloqueProduits utilisables : zirame, thirame, captafol, ferbame

La végétation n'a pas beaucoup évolué depuis le dernier Bulletin, et par conséquent, l'intervention est à faire ou à refaire en toutes zones, y compris en Haute-Savoie (mais non l'extrême Sud de la Circonscription) pour protéger les bourgeons latéraux qui ont commencé à démarrer.

Traitements d'hiver

Après la période froide que nous venons de traverser, il est encore temps de combattre par cette intervention le Pou de San José, la teigne des fleurs de cerisier ainsi que la cochenille rouge qui est en recrudescence, principalement sur poirier. Si la végétation a démarré, on aura alors recours à un oléoparathion.

Monilia de l'abricotier

Traitement au moyen d'un produit cuprique apportant 375 g de cuivre à l'hl.

Le stade B-C commence à être atteint dans les zones d'abricotiers. C'est le moment d'intervenir contre cette grave maladie.

Il est indispensable auparavant d'avoir éliminé au moment de la taille les rameaux atteints et fruits momifiés, ainsi que de cureter les chancres.

Puceron vert du pêcher (Myzus)

La lutte contre les fondatrices est à faire au stade D qui sera prochainement atteint dans le Sud de la Circonscription.

On utilisera le lindane à 30 g de ma/hl.

**VIGNE**ACARIOSE

Au printemps, les ceps attaqués présentent un rabougrissement de la végétation. Les feuilles sont petites, frisées et duveteuses.

Sur les parcelles attaquées de façon chronique, une application spécifique peut se justifier.

. Traitement

Celui-ci sera effectué le plus près possible de la reprise de végétation.

En cette période, entre le stade A et B, les huiles jaunes (DYTROL 50, SEPPIC VIGNE, VERALENE 3 FLUIDE, TRAITEMENT D'HIVER UMUPRO) à 2-3 l/hl seront utilisées.


Plus tard, du stade B à C on les remplacera par un oléoparathion à 45 g de ma/hl, mais avec une efficacité moindre.

On notera une action secondaire intéressante des traitements précoces à base d'huile sur cochenille et érinose.


La réussite de ce traitement dépendra d'une bonne application, soit :

- traitement avec une forte pression
- mouillage abondant des ceps


# abricotier



# prunier



## pêcher



## cerisier

